

# Sortenbeschreibung

## Sorte

## KALLE

Art	Horstrotschwingel
Botanischer Name	Festuca rubra commutata
Saatstärke	25 g/m <sup>2</sup>
Reihenabstand	breitwürfig
Saatzeit	März bis September
Aussaattiefe	oberflächlich

### Agronomische Kennzahlen:

Zierrasen	7*
Gebrauchsrasen (GR)	8*
Strapazierrasen	(-)*
Landschaftsrasen	7*
GR Narbenfarbe	5**
GR Blattfeinheit	8**
GR Narbendichte (ND)	8**
GR ND innerhalb der Art	8**
GR Winteraspekt	7**
GR Vegetationsaspekt	8**
Eignung im Tiefschnittrasen	5**



### Erläuterung der angegebenen Kennzahlen:

\* 3: Bedingt geeignet / 6: Geeignet bis gut geeignet / 9: Sehr gut geeignet

\*\* 1: Sehr früh, kurz, gering / 5: Mittel / 9: Sehr spät, lang, stark

### Quellen:

\* Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., RSM Rasen 2021

\*\* Bundessortenamt 2021, Beschreibende Sortenliste Rasengräser

### Kurzbeschreibung der Sorte

Als Horstrotschwingel zeigt sich KALLE als eine Sorte mit sehr hoher Narbendichte und Blattfeinheit mit einer hervorragenden Eignung im Gebrauchs- sowie einer guten Eignung im Zierrasen. Einsätze in Mischungen für Tiefschnitt- und Landschaftsrasen sind möglich, jedoch wird KALLE hier meist ein bis zwei Noten schwächer bewertet als im Gebrauchs- und Zierrasen. Besonders hervorzuheben ist eine hohe Resistenz gegenüber Fäulnis und eine sehr gute Unkrautunterdrückung. Dies ermöglicht eine sichere Bestandsetablierung.

### Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Hohe Eignung für Gebrauchs- und Zierrasen aufgrund hoher Blattfeinheit und Narbendichte  
Geringe Anfälligkeit gegenüber Fäulnis  
Hohe Unkrautunterdrückung

### Bemerkungen

Horstrotschwingel ist die Subspezies innerhalb der Art Rotschwingel mit der wichtigsten Bedeutung im Rasensegment. Das Sortiment in Deutschland zugelassener Sorten ist größer als bei den Ausläufer- und Kurzausläuferrotschwingeln. Horstrotschwingel bildet keine Ausläufer und zeichnet sich durch eine sehr dichte und feine Narbe aus. Die Toleranz gegenüber Trockenheit, Tiefschnitt und Salz ist jedoch etwas geringer als beim Kurzausläuferrotschwingel ausgeprägt.

