

Sortenbeschreibung

Sorte

HOMESTAR

| | |
|------------------|-------------------------|
| Art | Horstrotschwingel |
| Botanischer Name | Festuca rubra commutata |
| Ploidie | 6 |
| Saatstärke | 25 g/m ² |
| Reihenabstand | breitwürfig |
| Saatzeit | März bis September |
| Aussaattiefe | oberflächlich |

Agronomische Kennzahlen:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Resistenz gegen Rotspitzigkeit | 8** |
| Narbenfarbe | 6** |
| Blattfeinheit | 9** |
| langsamer Wuchs | 7** |
| GR Unkrautfreiheit | 9** |
| GR Narbendichte | 9** |
| GR Narbendichte innerhalb der Art | 9** |
| GR Winteraspekt | 7** |
| GR Vegetationsaspekt | 8** |
| Eignung im Zierrasen | 9** |
| Eignung im Gebrauchsrasen (GR) | 9* |
| Eignung im Tiefschnittrasen | 8* |
| Eignung im Landschaftsrasen | 7* |



Erläuterung der angegebenen Kennzahlen:

1: Sehr früh, kurz, gering / 5: Mittel / 9: Sehr spät, lang, stark

Quelle:

* Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., RSM Rasen 2025

** Bundessortenamt 2025, Beschreibende Sortenliste Rasengräser

Kurzbeschreibung der Sorte

Die Sorte HOMESTAR ist eine der führenden Horstrotschwingelsorten. HOMESTAR kennzeichnet sich durch Bestnoten in den Bereichen Narbendichte, Unkrautfreiheit und Blattfeinheit. Die Sorte weist eine hervorragende Eignung im Zierrasen und einer sehr guten Eignung im Gebrauchsrasen auf. Die Sorte bildet eine tiefschnittverträgliche Narbe aus. Besonders hervorzuheben ist auch eine hohe Resistenz gegenüber Krankheiten in Kombination mit sehr hohem Vermögen zur Unkrautunterdrückung, was insbesondere im intensiv gepflegten Zierrasen ein wichtiges Merkmal ist.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Höchstmögliche Eignung für Gebrauchs- und Zierrasen aufgrund hoher Blattfeinheit und Narbendichte
Geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten
Höchstmögliche Unkrautunterdrückung

Bemerkungen

Horstrotschwingel ist eine Subspezies innerhalb der Art Rotschwingel mit hoher Bedeutung im Rasensegment. Das Sortiment in Deutschland zugelassener Sorten ist größer als bei den Ausläufer- und Kurzausläuferrotschwingeln. Horstrotschwingel bildet keine Ausläufer und zeichnet sich durch eine sehr dichte und feine Narbe aus. Die Toleranz gegenüber Trockenheit, Tiefschnitt und Salz ist jedoch etwas geringer als beim Kurzausläuferrotschwingel ausgeprägt.

