

Sorte Dt. Weidelgras	Ploidie	Ährenschieben (Reifegruppe)	Massebildung im Anfang	Neigung zu Auswinterung	Anfälligkeit für Rost	Ausdauer	Narbendichte	TM-Ertrag gesamt	empfohlen in:	Art.-Nr.
ARTONIS (M) (H)	t	1 (sehr früh)	7	4	4	6	5	6	NWL	100329
ARVICOLA (M) (H)	t	1 (sehr früh)	8	4	4	6	6	5	NWL, RHT, B-W, B, SAN	100372
SALMO (M)	t	2 (sehr früh bis früh)	7	4	3	5	5	5	NWL	100584
SORONIA	t	3 (früh)	7	4	3	5	5	6	NWL	100536
BELLATOR	t	4 (früh bis mittel)	7	4	4	7	5	7	NWL	100656
TRIBAL (M)	t	4 (früh bis mittel)	6	4	3	6	5	6	NWL	100458
SORAYA (M) (H)	t	5 (mittel)	6	4	4	6	4	6	NWL	100408
MELGRAPPA	t	6 (mittel bis spät)	5	4	4	7	5	6	NWL	100307
AKURAT	t	8 (spät bis sehr spät)	5	5	5	6	5	6	RHT, SAN, B	100353
MELFROST (M)	t	8 (spät bis sehr spät)	5	4	4	7	5	6	NWL, BW	100462
MELJAM	d	8 (spät bis sehr spät)	4	5	4	6	6	6	NWL	100728
MELPAULA	t	8 (spät bis sehr spät)	5	4	3	7	5	5	NWL	100569

Quelle: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste, Stand 2022

 besonders gut

M = Mooreignung H = Höhenlage

Note	Massebildung, Neigung zur Auswinterung, Anfälligkeit für Krankheiten	Narbendichte	Ertrag, Ausdauer
1	fehlend oder sehr gering	sehr locker	sehr niedrig
2	sehr gering bis gering	sehr locker bis locker	sehr niedrig bis niedrig
3	gering	locker	niedrig
4	gering bis mittel	locker bis mittel	niedrig bis mittel
5	mittel	mittel	mittel
6	mittel bis stark	mittel bis dicht	mittel bis hoch
7	stark	dicht	hoch
8	stark bis sehr stark	dicht bis sehr dicht	hoch bis sehr hoch
9	sehr stark	sehr dicht	sehr hoch



www.freudenberger.net